

LEIMAY®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

LEIMAY

Composizione

100 g di prodotto contengono

Amisulbrom puro..... 17,70 (=200 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo:

(H351) Sospettato di provocare il cancro

(H319) Provoca grave irritazione oculare

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza:

Prevenzione: (P280) Indossare guanti /proteggere gli occhi

Reazione: (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Smaltimento: (P273) Non disperdere nell'ambiente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente

Titolare della registrazione:

NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. Parc d'affaires de Crecy 10A rue de Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or France

Stabilimenti di produzione:

SCAM S.p.A. – Modena – tel. 059 58.65.11

SBM Formulations – Beziers cedex, Francia – Tel. +33 0467355050

ARYSTA LIFESCIENCE SAS –BP 80, Route d'Artix, 64150 Noguères, France - Tel. +33(0)5 59 60 92 92

Stabilimento di confezionamento:

STI Solfotecnica Italiana Spa - Via Evangelista Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA) - Tel. 0545 992455

Stabilimento di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. – Via Antonio Battistella 22, 44123 Ferrara (FE) - Tel. 0532 51119

Distribuito da:

UPL ITALIA SRL – Via Terni 275, 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547 661523

Contenuto netto: litri 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,750-0,8-0,9-1-1,1-1,2-1,5-1,8-2-2,250-2,5-3-4-4,5-5-10

Registrazione Ministero della Salute n. 14406 del 25/05/2012

Partita n°:...

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per lavite.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per Pomodoro, Melanzana e Lattuga.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 3 metri da corpi idrici superficiali per la patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione. **Terapia:** trattamento sintomatico e di supporto. **Non provocare il vomito.**

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: LEIMAY® è un fungicida ad attività penetrante e di contatto appartenente ad una nuova famiglia chimica, le sulfonamidi. Possiede una limitata attività curativa ma una notevole efficacia preventiva. Si caratterizza, inoltre, per la lunga persistenza d'azione. LEIMAY® è particolarmente efficace nei confronti dei funghi della classe *Oomycetes*, quali peronospora, pseudoperonospora, fitoftora, Bremia, ecc.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: LEIMAY® può essere impiegato sulle colture e alle dosi di seguito riportate:

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) 0,375 l/ha, effettuare i trattamenti in via preventiva associando alla miscela prodotti di copertura; effettuare i trattamenti quando si verificano le condizioni di sviluppo del patogeno e proseguirli ad intervalli di 10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia. Non effettuare più di 3 trattamenti per anno e non più di 2 trattamenti consecutivi.

Patata (pieno campo): contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*)

0,5 l/ha (50 ml/hl utilizzando 10 hl di acqua per ettaro), iniziando la difesa preventivamente, allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, e proseguirla ad intervalli di 7- 10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia. Non effettuare più di 4 trattamenti per anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).

Pomodoro, Melanzana: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*)

60 ml/hl (0,6 l/ha), intervenendo preventivamente, quando si instaurano condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno, e proseguendo la lotta ad intervalli di 7-10giorni. Non effettuare più di 3 interventi per anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).

Lattuga: contro la Peronospora (*Bremia lactucae*) utilizzare 60 ml/hl (0,6 l/ha) iniziando i trattamenti preventivamente quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo e proseguirli ad intervalli di circa 7 giorni. Non effettuare più di 3 interventi per anno con il prodotto o con altri aventi lo stesso meccanismo d'azione (MoA).

COMPATIBILITA': il prodotto risulta scarsamente compatibile con i preparati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite; 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana e lattuga; 7 giorni prima della raccolta su patata.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato

LEIMAY®

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

LEIMAY

Composizione

100 g di prodotto contengono

Amisulbrom puro 17,70 (=200 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo:

(H351) Sospettato di provocare il cancro

(H319) Provoca grave irritazione oculare

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza:

Prevenzione: (P280) Indossare guanti /proteggere gli occhi

Reazione: (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Smaltimento: (P273) Non disperdere nell'ambiente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente

Titolare della registrazione:

NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. Parc d'affaires de Crecy 10A rue de Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or France

Stabilimenti di produzione:

SCAM S.p.A. – Modena – tel. 059 58.65.11

SBM Formulations – Beziens cedex, Francia – Tel. +33 0467355050

ARYSTA LIFESCIENCE SAS –BP 80, Route d'Artix, 64150 Noguères, France - Tel. +33(0)5 59 60 92 92

Stabilimento di confezionamento:

STI Solfotecnica Italiana Spa-Via Evangelista Torricelli, 2, 48033 Cotignola (RA) - Tel. 0545 992455

Stabilimento di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. – Via Antonio Battistella 22, 44123 Ferrara (FE) Tel. 0532 51119

Distribuito da:

UPL ITALIA SRL – S. Carlo di Cesena (FC)-47522 - Via Terni, 275-Tel. 0547 661523

Contenuto netto: litri 0,1

Registrazione Ministero della Salute n. 14406 del 25/05/2012

Partita n°...

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**