

# PREV-AM® PLUS

Insetticida-Fungicida-Acaricida polivalente multi colture  
LIQUIDO SOLUBILE (SL)

## Composizione:

100 g di prodotto contengono  
**Olio essenziale di arancio dolce**  
Coformulanti

**5,88 g (= 60 g/l)**  
q.b. a 100 g



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
H319 – Provoca grave irritazione oculare. H332 – Nocivo se inalato.  
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261a - Evitare di respirare i vapori. P270 – non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302+P352 - In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P312 - Consultare un medico in caso di malessere. P333+P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## Fabbricante e titolare della registrazione:

**Oro Agri Europe S.A.**

Estrada Municipal 533, Estrada do Lau 2950-401 Palmela, Portogallo

Tel: +351 210 539 983 [www.oroagri.eu](http://www.oroagri.eu)

**Distribuito da:** Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA), Italia

## Stabilimenti autorizzati per la produzione:

Oro Agri Europe S.A. – Palmela (Portogallo)

**Registrazione n. 16379 del 12/05/2015 del Ministero della Salute**

**Taglie autorizzate:** 250 – 500 ml; 1 – 5 – 10 – 20 litri

**Partita n.** Vedere sulla confezione

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dalla zona non coltivata e dai corpi idrici superficiali in caso di trattamento su fruttiferi, luppolo ed alberi ornamentali.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata e dai corpi idrici superficiali per tutte le altre colture. Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una zona non trattata di 5 metri dal bordo dell'area trattata verso l'interno e lungo tutto il perimetro di campo, quando il prodotto viene applicato ad una dose compresa tra 3-8 l/ha.

Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura.

## AVVERTENZE PER GLI OPERATORI

Per le applicazioni in serra in condizioni di scarsa ventilazione indossare maschera facciale con filtri a carboni attivi (A1)

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni.

## MODO D'AZIONE

PREV-AM® PLUS è un insetticida-fungicida-acaricida che agisce per contatto con un modo d'azione fisico. Provoca il disseccamento della cuticola degli insetti con esoscheletro molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, quali mosche bianche, tripidi, cicaline ed inoltre delle pareti cellulari degli organi esterni (micelio, conidi, cleistotecii, ecc.) delle malattie fungine.

## PRECAUZIONI E CONSIGLI PER L'IMPIEGO

- Agitare il contenitore prima dell'uso
- Conservare il prodotto nella sua confezione originale, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato
- I contenitori devono rimanere ben chiusi dopo l'impiego, conservando la chiusura originale.
- Qualora non si utilizzi interamente il contenuto della confezione di PREV-AM® PLUS prevederne l'impiego entro sei mesi dall'apertura.
- In caso di ingestione consultare un medico
- Eliminare la miscela di solo PREV-AM® PLUS eventualmente rimasta in eccesso nella botte, irrorando le colture limitrofe più vicine sulle quali il preparato è autorizzato
- Risciacquare più volte il contenitore e mettere l'acqua di lavaggio nella miscela da irrorare.

Si consiglia di applicare su vegetazione asciutta al fine di evitare la diluizione del prodotto, che diminuisce l'efficacia del trattamento. Una buona qualità di nebulizzazione è necessaria per ottimizzare l'azione di contatto. Se ne sconsiglia l'impiego su vegetazione sofferente da stress idrici. PREV-AM® PLUS si applica tutta la stagione all'inizio delle infezioni di malattie fungine o alla prima comparsa dei fitofagi, mantenendo un turno di interventi appropriato in

funzione della pressione dei parassiti. Il modo d'azione fisico garantisce l'assenza di comparsa di fenomeni di resistenza. PREV-AM® PLUS rappresenta una valida soluzione per strategie di lotta atte a ridurre i fenomeni di resistenza nei confronti delle molecole di sintesi.

Le miscele dovranno essere conformi alla regolamentazione prevista nei disciplinari di protezione integrata.

E' sconsigliata l'aggiunta di bagnanti/adiuvanti al PREV-AM® Plus, come pure miscele estemporanee di PREV-AM® PLUS con zolfi bagnabili a dosi piene; mentre è possibile sulla vite l'utilizzo di ridotte dosi di zolfi bagnabili (es: 1-2 Kg/ha all'80%) e PREV-AM® PLUS.

Su pomacee sono possibili miscele estemporanee di PREV-AM® PLUS con zolfi bagnabili, devono però essere rispettate le indicazioni previste per la vite (massimo 1-2 Kg/ha di zolfo all'80%). Non trattare con questa associazione piante affette da stress biotici, abiotici e con temperature superiori ai 25° C.

In caso di miscele estemporanee con altri agrofarmaci aventi lo stesso target, si consiglia di utilizzare le dosi inferiori riportate in etichetta.

E' consigliato l'utilizzo di un agente antischiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio, aspetto fisico correlato spesso al tipo di atomizzatore utilizzato. PREV-AM® PLUS è indicato per le aziende ad indirizzo di difesa convenzionale, integrata e biologica delle colture.

#### **DOCHE – EPOCHE – MODALITA' D'IMPIEGO**

Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti, si riferiscono ad ettaro, si riporta anche il quantitativo d'acqua idoneo per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali (oppure su vite con atomizzatori pneumatici) in relazione alla dimensione delle piante. La dose massima di utilizzo del PREV-AM® PLUS è fissata in relazione al volume d'acqua massimo indicata in forma tabellare di seguito. Qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, la dose per ettaro può essere diminuita in modo da mantenere la concentrazione per ettolitro.

<b>Coltura</b>	<b>Parassiti controllati</b>	<b>Dosi di prodotto per ettaro</b>	<b>Dosi ml/hl e volumi di acqua per ettaro</b>
<b>VITE</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Uncinula necator</i> ) <b>Peronospora</b> con sporulazione in atto ( <i>Plasmopara viticola</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Drepanothrips reuteri</i> ), <b>Cicaline</b> ( <i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i> ecc.)	<b>1,6 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (200 l/ha)
	<b>Erinosi</b> ( <i>Colomerus vitis</i> )	<b>2 l/ha</b>	<b>1000 ml/hl</b> (200 l/ha)
<b>POMODORO, MELANZANA, PEPERONE</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> ecc.)	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>POMODORO</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Peronospora</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> ) <b>Acari</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Aculops lycopersici</i> )	<b>3 l/ha</b> <b>4 l/ha</b>	<b>400/600 ml/hl</b> (500-1000 l/ha)
<b>CAROTA</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	<b>2,4 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (400 l/ha)
<b>CETRIOLO</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> ecc.)	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	<b>4 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>ZUCCHINO, CETRIOLINO</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>MELONE</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> ecc.)	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>LATTUGA</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ), <b>Peronospora</b> ( <i>Bremia lactucae</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>PORRO</b>	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )	<b>6,4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (800 l/ha)
<b>CAVOLI (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa)</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Aleyrodes brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> , ecc.)	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> ecc.)	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>CAVOLI a foglia</b>	<b>Ruggine bianca</b> ( <i>Albugo candida</i> )	<b>2 l/ha</b>	<b>500 ml/hl</b> (400 l/ha)
<b>LEGUMINOSE da GRANELLA</b> (Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava)	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> ecc.)	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO</b>	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips tabaci</i> ecc.)	<b>3,2 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (400 l/ha)
<b>VALERIANELLA, PREZZEMOLO</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe sp.</i> )	<b>1,8 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (300 l/ha)
<b>SCAROLA RICCIA</b> (in pieno campo ed in serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>SCORZONERA e BARBA DI BECCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)

<b>RAVANELLO</b>	<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora parasiticae</i> )	<b>3,2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (800 l/ha)
<b>TABACCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe spp.</i> ), <b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora tabacina</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> )	<b>2 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips tabaci ecc.</i> )	<b>3,2 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (400 l/ha)
<b>RIBES, LAMPONE, MORA, UVA SPINA</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerotheca spp.</i> ), <b>Cicaline</b> ( <i>Metcalfa pruinosa ecc.</i> ), <b>Psilla e Cercopidi</b>	<b>2,4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (300 l/ha)
	<b>Ragnetto rosso</b> ( <i>Tetranychus urticae ecc.</i> ) ed <b>Eriofidi</b>	<b>2 l/ha</b>	<b>1000 ml/hl</b> (200 l/ha)
<b>FRAGOLA</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerotheca spp.</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella occidentalis ecc.</i> )	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>MELO, PERO, COTOGNO</b>	<b>Psille del melo</b> ( <i>Cacopsylla mali</i> ), <b>Cicaline e Cercopidi</b>	<b>4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (500 l/ha)
	<b>Psilla del pero</b> ( <i>Psylla pyri ecc.</i> ), <b>Oidio</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	<b>2,8 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (700 l/ha)
	<b>Ticchiolatura</b> ( <i>Venturia inaequalis, Venturia pyrina</i> )	<b>3 l/ha</b>	<b>250/300 ml/hl</b> (1000/1200 l/ha)
<b>PESCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	<b>6 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>ACTINIDIA</b>	<b>Cicaline</b> ( <i>Empoasca spp., Metcalfa pruinosa</i> ), <b>Cercopidi</b> ( <i>Cercopis spp.</i> )	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>AGRUMI</b> (arancio, limone, pompelmo, mandarino, clementino, cedro, bergamotto, chinotto, kumquat, limetta, lime)	<b>Cicaline</b> ( <i>Empoasca spp., ecc.</i> ), <b>Cercopidi</b> ( <i>Cercopis spp.</i> ), <b>Psilla</b> ( <i>Psylla citrus</i> ), <b>Cocciniglie</b> ( <i>Aonidiella auranti ecc.</i> ), <b>Aleurodidi</b> ( <i>Aleurocactus spiniferus</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Heliothrips spp.</i> )	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
	<b>Acari</b> ( <i>Panonychus citri, Tetranychus urticae ecc.</i> )	<b>6 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>ANANAS</b>	<b>Cocciniglie</b> ( <i>Diaspis bromelia ecc.</i> )	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>AVOCADO</b>	<b>Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi</b>	<b>0,8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (100 l/ha)
	<b>Tigre</b> ( <i>Pseudacysta perseae</i> )	<b>1 l/ha</b>	<b>1000 ml/hl</b> (100 l/ha)
<b>BANANO</b>	<b>Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi</b>	<b>2 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (250 l/ha)
<b>FRUTTO della PASSIONE</b>	<b>Acari, Cocciniglie, Tripidi</b>	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>GUAIAVE</b>	<b>Aleurodidi</b>	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>MANGO</b>	<b>Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi</b>	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>PALME alimentari</b>	<b>Aleurododi</b>	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>PAPAYA</b>	<b>Acari, Cocciniglie, Oidio</b>	<b>8 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>LUPPOLO</b>	<b>Oidio</b>	<b>6 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>PIANTE OFFICINALI da INFUSIONE</b>	<b>Malattie fungine</b>	<b>3 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (500 l/ha)
<b>CRISANTEMO</b>	<b>Ruggine bianca</b> ( <i>Puccinia oriana</i> )	<b>10 l/ha</b>	<b>1000 ml/hl</b> (1000 l/ha)
<b>FLOREALI ed ORNAMENTALI</b>	<b>Oidio</b>	<b>6 l/ha</b>	<b>600 ml/hl</b> (1000 l/ha)
	<b>Tripidi</b>	<b>6,4 l/ha</b>	<b>800 ml/hl</b> (800 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b>	<b>4 l/ha</b>	<b>400 ml/hl</b> (1000 l/ha)

ROSA	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
	Aleurodidi ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	4 l/ha	400 ml/hl (1000 l/ha)
	Tripidi	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
ALBERI ed ARBUSTI ornamentali	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
	Tripidi ( <i>Thrips spp.</i> )	6,4 l/ha	800 ml/hl (800 l/ha)
	Cicaline, Psille, Cimici	8 l/ha	800 ml/l (1000 l/ha)
GENZIANA, DRAGONCELLO	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
RISO *	Brusone ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	3,6/4 l/ha	600-800 ml/hl (500-600l/ha)
MAIS DOLCE *	Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> )	2,4/3,6 l/ha	400-600 ml/hl (400-600 l/ha)

Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:

**2 trattamenti per Ribes e Lampone su Ragnetto rosso e Eriofidi, per Vite su Erinosi, Riso, Mais dolce**  
**4 trattamenti per Pesco, Porro, Rosa ed altre colture floreali ed ornamentali**  
**6 applicazioni su tutte le altre colture**

In caso di attacchi medi o forti, PREV-AM® PLUS deve essere utilizzato ai dosaggi più contenuti in associazione estemporanea con fungicidi o insetticidi specifici contro le avversità da combattere. In caso di attacchi deboli distanziare i trattamenti di 7/8 giorni.

**Negli impieghi su melo e pero contro ticchioratura**, per migliorare la copertura su frutti e foglie, si consiglia di applicare PREV-AM® PLUS in miscela con prodotti con azione contatticida (es. preparati di rame o zolfo a dosaggi ridotti per gli interventi in vegetazione ecc.). Se miscelato a fungicidi dotati di proprietà curative ne può migliorare l'azione. In caso di pressione infettiva media/ridotta distanziare i trattamenti di 6/8 giorni; in presenza di forte pressione di *Venturia spp.* ridurre conseguentemente l'intervallo in relazione alle condizioni ambientali ed alle proprietà biologiche dei partner. Il turno di intervento lo si può allungare per contenere le infezioni secondarie estive, di norma più lievi delle primaverili. Su **pomacee** non applicare in post-floritura PREV-AM® PLUS con concentrazioni superiori a **400 ml/hl**, indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti. Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di miscela irrorante su foglie e frutti.

**Negli impieghi su riso** applicare PREV-AM® PLUS dalla comparsa dei primi sintomi del brusone su foglia, dalla fuoriuscita della pannocchia in poi l'aggiunta di zolfo al PREV-AM® PLUS ne migliora l'efficacia contro la malattia. **Negli impieghi mais dolce** applicare PREV-AM® PLUS contro il ragnetto rosso alle prime infestazioni del fitofago. L'azione del prodotto è diretta prevalentemente contro le forme giovanili ed adulte del fitofago.

Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di **100-200 ml/hl** (0,1% - 0,2%) la concentrazione di PREV-AM® PLUS rispetto alle dosi sopra indicate. In caso di una infestazione contemporanea di oidio e di aleurodidi (mosche bianche), una singola applicazione avrà effetto su entrambe le avversità, utilizzando il dosaggio più elevato.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su tutte le colture.**

**Compatibilità:** nelle applicazioni sperimentali e di campo non sono emerse incompatibilità con altre molecole.

**AVVERTENZE:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Fitotossicità:** PREV-AM® PLUS non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità alle dosi e alle prescrizioni indicate in etichetta. In considerazione della continua introduzione di nuove varietà di colture orticole e frutticole, si consiglia di valutare la selettività di PREV-AM® PLUS su piccole superfici prima di procedere ad interventi in pieno campo.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Il contenitore non può essere riutilizzato;

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**DA NON VENDERSI SFUSO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Impiego su mais dolce e riso autorizzato dal 18 Luglio al 14 Novembre 2023 \*