

ZORVEC™ VINABRIA®

Antiperonosporico per la vite (da vino e da tavola)
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: Gruppo M4, Gruppo 49 (FRAC)

Composizione di ZORVEC VINABRIA

Folpet 500 g/L
Oxathiapiprolin 10 g/L
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H) -one



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. **H332:** Nocivo se inalato. **H351:** Sospettato di provocare il cancro. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare gli aerosol. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi. **P302+P352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P308+P313:** IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P363:** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:

Corteva Agriscienze France S.A.S. – Cemay – Francia

Phyteurop – Montreuil-Bellay – Francia

Corteva Agriscienze LLC – Valdosta – USA

Sinteco Logistics SpA – San Giuliano Milanese (MI) – Italia

(solo ri-etichettatura)

Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 1-2-2,5-4-5-8-10 Litri

Registrazione n° 16957 del 19.12.2018 del Ministero della Salute

Partita N. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Per proteggere gli organismi acquatici, fare riferimento alle misure di mitigazione riportate nella tabella sottostante:

| Coltura | Fascia di sicurezza da zone non coltivate | Combinazioni ALTERNATIVE alla fascia di sicurezza da zone non coltivate |
|----------------------------|---|---|
| Vite (trattamenti precoci) | 20 metri | Fascia di rispetto di 3 metri + Utilizzo di atomizzatori tradizionali con ugelli antideriva che riducano la deriva del 75% (TIPO ISO 04 e superiori) |
| | | Fascia di rispetto di 3 metri + Utilizzo di atomizzatori tradizionali con ugelli antideriva che riducano la deriva del 50%, In presenza di siepe al bruno tra il vigneto e il corpo idrico superficiale Unitamente ad irrorazione dell'ultimo filare tenuta verso l'interno |
| Vite (trattamenti tardivi) | 20 metri | Fascia di rispetto di 3 metri + Utilizzo di atomizzatori tradizionali con ugelli antideriva che riducano la deriva del 25% (TIPO ISO 01 03 e superiori) Trattamento con siepe al verde tra il vigneto e il corpo idrico superficiale |
| | | Fascia di rispetto di 3 metri + In presenza di siepe al verde tra il vigneto e il corpo idrico superficiale Unitamente ad irrorazione dell'ultimo filare tenuta verso l'interno |

O IN ALTERNATIVA

- Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie]. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

- Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
- Le operazioni culturali sulla vite possono essere effettuate, indossando guanti protettivi, solo una volta trascorsi 2 giorni dall'ultimo trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico o un centro antiveleni.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15-20 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica

Consultare Un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

ZORVEC VINABRIA è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite. Il prodotto è dotato di movimento translaminare, di sistemica xilematica e di azione di contatto.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

VITE (da vino e da tavola): per il controllo di Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 2 l/ha di ZORVEC VINABRIA avendo cura di bagnare bene la vegetazione. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 0.2 l/ha fino ad un massimo di 2.4 l/ha.

Effettuare un massimo di 2 applicazioni per anno ad un intervallo di 10-14 giorni. Rispettare l'intervallo più breve in caso di alta pressione della malattia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità necessaria di ZORVEC VINABRIA direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Mantenere l'agitatore in funzione durante tutto il trattamento. Non usare agitatori ad aria. Applicare immediatamente dopo la preparazione della soluzione. Quando usato in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo la sequenza:

- sacchetti idrosolubili (WSB)
- granuli idrosolubili (SG)
- granuli dispersibili (WG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensione concentrata (SC)
- suspoemulsioni (SE)
- dispersioni oleose (OD)
- emulsioni acquose (EW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- fertilizzanti

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE DELLE RESISTENZE

ZORVEC VINABRIA è una miscela di oxathiapiprolin (gruppo FRAC 49) e folpet (gruppo FRAC M4), sostanze attive aventi diverso meccanismo d'azione e pertanto rappresenta una buona soluzione per prevenire o ritardare l'insorgere di resistenze. Risulta comunque consigliabile usare il prodotto in un programma di difesa che preveda l'uso di antiperonosporici aventi differente meccanismo d'azione.

Le seguenti restrizioni dovranno essere considerate quando si applica ZORVEC VINABRIA o qualunque altro fungicida contenente una sostanza attiva appartenente al gruppo FRAC 49:

- Il prodotto deve essere applicato preventivamente.
- Si consiglia di effettuare un numero di trattamenti con ZORVEC VINABRIA non superiore ad un terzo del numero totale di applicazioni con prodotti fitosanitari ad azione antiperonosporica.
- Applicare ZORVEC VINABRIA (o qualunque altro formulato contenente una sostanza attiva appartenente al Gruppo 49 FRAC) preventivamente e non più di 2 volte per stagione.
- Eventuali fungicidi applicati dopo i trattamenti effettuati con ZORVEC VINABRIA dovrebbero avere un meccanismo d'azione differente e preferibilmente essere dotati di attività curativa.
- Non applicare il prodotto in vivai per la produzione di barbatelle.

(ZORVEC VINABRIA – segue a pag.2)

(ZORVEC VINABRIA – segue da pag.1)

COMPATIBILITÀ:

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

ZORVEC VINABRIA deve essere applicato su vegetazione asciutta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 56 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti** contattare: 0039 0372 709900/709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale, del 05/09/2022 c modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024